

قرار رقم (١٣) لسنة ١٩٨٦
بشأن تعديل الجدول رقم (٢) بتقدير درجات العجز،
المرافق للقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٥
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة:
بعد الإطلاع على الأمر الأميري رقم (٥) لسنة ١٩٨٦،
وعلى القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٥ بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم
(١٣) لسنة ١٩٧٥، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة،
وبناء على عرض وزير المالية والإقتصاد الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي
المادة الأولى

تضاف إلى حالات العجز الواردة بالجدول رقم (٢) بتقدير درجات العجز المرافق
للقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٥ المشار إليه، حالات العجز المرفقة لهذا القرار.

المادة الثانية

على وزير المالية والإقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
حمد بن عيسى آل خليفة

صدر بتاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٠٧ هـ
الموافق: ٢١ ديسمبر ١٩٨٦ م

تابع الجدول رقم (٢) بتقرير درجات العجز المرافق للقانون
رقم (١٣) لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٦

النسبة المئوية لدرجة العجز		العجز المتخلف
أيسر	أيمن	
		الطرف العلوي انكيلوز المفاصل
		الإبهام :
٪٦	٪٨	انكيلوز المفصل السلامي السلامي في حالة بسط كامل
٪٨	٪١٠	انكيلوز المفصل السلامي السلامي في حالة ثني كامل
٪٨	٪١٠	انكيلوز المفصل المشطي السلامي في حالة ثني أو بسط كامل
٪٦	٪٨	انكيلوز المفصل المشطي السلامي في حالة نصف ثني
٪١٢	٪١٥	انكيلوز المفصلين المشطي السلامي والسلامي السلامي للإبهام في حالة ثني جزئي
٪١٥	٪١٨	انكيلوز المفصلين المشطي السلامي والسلامي السلامي في حالة بسط كامل أو ثني كامل .
٪١٢	٪١٥	انكيلوز المفصل بين مشطية الإبهام وعظام الرسغ .
٪٤	٪٥	خلع بالمفصل السلامي السلامي للإبهام
٪١٠	٪١٥	خلع بالمفصل المشطي السلامي
٪١٦	٪٢٠	تقريب جبري للإبهام نتيجة أثره التئام أو فقد عمل العضلة المباعدة .
		السبابة :
٪٤	٪٦	انكيلوز المفصل السلامي السلامي الأول في حالة ثني أو بسط .
٪١	٪٢	انكيلوز المفصل السلامي السلامي الثاني في حالة ثني أو بسط .
٪٥	٪٨	انكيلوز المفصلين السلامي الأول والثاني في حالة بسط أو ثني .
٪٦	٪٨	انكيلوز المفصل المشطي السلامي في حالة ثني أو بسط .

النسبة المئوية لدرجة العجز		العجز المتخلف
أيسر	أيمن	
٪١٠	٪١٢	انكيلوز المفصل المشطي السلامي والسلامي السلامي الأول والثاني في حالة بسط كامل أو ثني كامل . <u>الوسطى :</u>
٪٤	٪٦	انكيلوز المفصل السلامي السلامي الأول في حالة ثني أو بسط .
٪١	٪٢	انكيلوز المفصل السلامي السلامي الثاني في حالة ثني أو بسط .
٪٥	٪٦	انكيلوز المفصلين السلامي السلامي الأول والثاني في حالة ثني أو بسط .
٪٤	٪٦	انكيلوز المفصل المشطي السلامي .
٪٨	٪١٠	انكيلوز المفاصل المشطي السلامي . والسلامي السلامي الأول والثاني في حالة ثني أو بسط .
		<u>البنصر أو الخنصر :</u>
٪٣	٪٤	انكيلوز المفصل السلامي السلامي الأول في حالة ثني أو بسط .
٪١	٪٢	انكيلوز المفصل السلامي السلامي الثاني في حالة ثني أو بسط .
٪٣	٪٤	انكيلوز المفصل المشطي السلامي
٪٤	٪٦	انكيلوز المفاصل المشطي السلامي السلامي الأول والثاني في حالة بسط أو ثني .
		<u>انكيلوز اليد :</u>
٪٥٠	٪٦٠	انكيلوز جميع مفاصل اليد أو الأصابع
٪٣٥	٪٤٥	انكيلوز جميع مفاصل اليد والأصابع فيما عدا الإبهام .
		<u>قطع الأوتار :</u>
		(أ) قطع الوتر الباسط عند قاعدة الأصبع (الأصبع في حالة ثني كامل) :
٪١٠	٪١٢	الإبهام
٪١٠	٪١٢	السبابة
٪٨	٪١٠	الوسطى
٪٦	٪٨	البنصر أو الخنصر
		قطع الوتر الباسط قبل إندغامه في السلامية الثانية (السلاميتين الأخيرتين في حالة ثني كامل) .

النسبة المئوية لدرجة العجز		العجز المتخالف
أيسر	أيمن	
٤٪	٦٪	الإبهام
٣٪	٤٪	السبابة
٢٪	٣٪	البنصر أو الخنصر
		قطع الوتر الباسط قبل إندغامه في
		السلامية الأخيرة مباشرة
		(والسلامية الأخيرة في حالة ثني كامل) :
٤٪	٦٪	الإبهام
٨٪	٢٪	السبابة
٥٪	٨٪	الوسطى أو البنصر أو الخنصر
		(ب) قطع الوتر القابض عند المفصل
		المشطي السلامي والسلامي السلامي
		الأول (الأصبع في حالة بسط كامل) :
١٦٪	٢٠٪	الإبهام
٨٠٪	١٢٪	السبابة
٥٪	٦٪	البنصر والخنصر
٨٪	٨٠٪	الوسطى
		(ج) قطع الوتر القابض عند المفصل
		السلامي السلامي الثاني (السلامية
		الأخيرة في حالة بسط كامل) :
٦٪	٨٪	الإبهام
٢٪	٣٪	السبابة
٨٪	٢٪	الوسطى
٨٪	٥٪	البنصر أو الخنصر
		(د) العضد والساعد :
٢٥٪	٣٠٪	تعود الخلع بالكتف
٣٠٪	٤٠٪	انكيلوز تام بالكتف
٢٥٪	٣٠٪	انكيلوز جزئي بالكتف
٢٠٪	٢٥٪	نقص في حركة رفع الذراع لموازاة
		الكتف .
٨٠٪	٨٥٪	نقص في حركة رفع الذراع إلى أعلى
		بمقدار ٣٠ درجة .
٣٠٪	٤٠٪	اثرة التنام مقيدة لحركة العضد
		والعضد ملتصق بالجسم .
٤٠٪	٥٠٪	كسر غير ملتحم بالعضد
٨٠٪	٨٥٪	كسر غير ملتحم بالنتوء المرفق

النسبة المئوية لدرجة العجز		العجز المتخلف
أيسر	أيمن	
%٤٠	%٥٠	انكيلوز المرفق في بسط كامل في درجة ١٨٠ درجة .
%٣٠	%٤٠	انكيلوز المرفق في زاوية ١٥٠ درجة
%٢٥	%٣٠	انكيلوز المرفق في زاوية ٩٠ درجة
%٣٥	%٤٠	اثره التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية ٤٥ درجة أو أقل (الساعد في حالة ثني لزاوية حادة)
%١٥	%٢٠	اثره التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية ٩٠ درجة
%١٢	%١٥	اثره التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية ١٣٥ درجة
%٤٠	%٥٠	كسر بالساعد مع إعاقة تامة في حركتي الكب والبطح
%٢٥	%٣٠	اثره التئام مقيدة لحركة الكب بين درجتى ١٠ و ٩٠
%١٥	%٢٠	اثره التئام مقيدة لحركة الكب بين درجتى ٤٥ و ٩٠
%١٠	%١٥	كسر بالتحام معيب بعظام الساعد عائق لحركات مفصل الرسغ .
%٢٠	%٢٥	انكيلوز تام بالرسغ
%١٢	%١٥	انكيلوز جزئي بالرسغ
%٢٠	%٢٥	انكيلوز الرسغ مع بسط اليد والكب كامل .
		العضلات والأعصاب والأوعية الدموية بالطرف العلوي
		١ - ضمور العضلات :
%٢٥	%٣٠	ضمور العضلة ذات الرأسين العضوية
%٢٠	%٣٠	ضمور العضلة الدالية
		٢ - شلل الأعصاب :
%٢٥	%٣٠	شلل العصب الزندي والإصابة عند المرفق .
%١٥	%٢٠	شلل العصب الزندي والإصابة عند اليد .
%٤٠	%٥٠	شلل العصب الكعبري أعلى الفرع للعضلة المثلثة الرأس .

النسبة المئوية لدرجة العجز		العجز المتخلف
أيسر	أيمن	
٪٣٠	٪٤٠	شلل العصب الكعبري
٪٣٥	٪٣٥	شلل العصب المتوسط
٪٨	٪١٠	شلل العصب تحت اللوح
٪١٥	٪٢٠	شلل العصب الدائري
٪٥٠	٪٦٠	شلل العصب الزندي والكعبري
٪٥٠	٪٦٠	شلل العصب الزندي والمتوسط
٪٦٥	٪٧٥	شلل العصب الزندي والكعبري والمتوسط
		٣ - الأوعية الدموية :
تعامل الحالة معاملة البتر		انسداد بالشرايين نتجت عنه غرغرينا .
من ٪١٠ إلى ٪٣٠		انسداد بالأوردة نتجت عنه أوزيما مزمنة .
٪٣٠		الطرف السفلي
٪١٢		كسر بالفخذ مع قصر ٦ سم والمفاصل جيدة مع ضعف متوسط بالعضلات
٪٨		كسر بالفخذ مع قصر ٤ سم
٪٢٠		كسر بالفخذ مع قصر ٣ سم
٪٣٠		كسر غير ملتحم بالرضغة مع ضعف بالفخذ
٪٢٠		كسر غير ملتحم بالرضغة مع ضعف شديد بالفخذ
٪٥٠		كسر بعظمتي الساق ملتحم بشكل معيب
٪٥٠		كسر غير ملتحم بالساق
٪٥٠		انكيلوز المفصل الحرقفي في وضع مناسب
٪٥٠		انكيلوز بالركبة في زاوية ١٠٠ درجة
٪٢٥		انكيلوز بالركبة متحرك بين درجتي ١٢٠ درجة و ١٧٠ درجة .
٪١٥		انكيلوز بالركبة متحرك بين درجتي ٩٠ درجة و ١٨٠ درجة .
من ٪٦٠ إلى ٪٥٠		اثرة التثام بخلفية الركبة مقيدة
من ٪٥٠ إلى ٪٣٠		لحركة البسط لغاية ٩٠ درجة أو أقل .
من ٪٣٠ إلى ٪١٠		اثرة التثام بخلفية الركبة مقيدة
		لحركة البسط لغاية ١٣٥ .
		اثرة التثام بخلفية الركبة مقيدة
		لحركة البسط لغاية ١٧٠

النسبة المئوية لدرجة العجز	العجز المتخلف
٢٥٪	التهاب مفصلي تشوهي بالركبة
٥٠٪	انكيلوز بكامل القدم مع رفع القدم لأعلى زاوية أكثر من ١٠٠ درجة
٣٥٪	انكيلوز بكامل القدم في زاوية ١٠٠ درجة .
٢٠٪	انكيلوز بكامل القدم في زاوية ٩٠ (أحسن وضع) .
١٥٪	انكيلوز إبهام القدم في وضع بسبب تعطيل حركة المشي .
١٥٪	انكيلوز في جميع أصابع القدم في وضع جيد .
١٥٪	تفرطح القدم نتيجة كسر العظام .
٢٠٪	العضلات والأعصاب بالطرف السفلي
٣٠٪	١ - ضمور عضلات الجزء الأمامي للفخذ
٤٠٪	ضمور عضلات الفخذ كلها
٣٠٪	ضمور عضلات الطرف السفلي
١٠٪	ضمور عضلات الساق جميعها
من ١٠٪ إلى ٨٠٪	ضمور عضلات الجزء الأمامي للساق
٥٠٪	ضمور عضلات المطرد
	صك تام (جنيو فالجم) مع ضعف شديد بالعضلات
	٢ - شلل أعصاب الطرف السفلي :
٥٠٪	شلل تام بالعصب الوركي
٥٠٪	شلل تام بالعصب الفخذي
٣٠٪	شلل العصب المأبضي الوحشي
٣٠٪	شلل العصب المأبضي الأنسي
٤٠٪	شلل العصب المأبضي الأنسي والوحشي
٦٠٪	شلل العصب المأبضي الأنسي والوحشي مصحوب بالألم .
٢٠٪	شلل العصب الشظوي .
	٣ - الأوعية الدموية :
	انسداد الشرايين نتجت عنه غرغرينا
	انسداد وريدي نتجت عنه أوزيما مزمنة .
	انسداد وريدي نتجت عنه أوزيما
	بالطرفين السفليين مع قرحة مزمنة
	تؤثر على المشي والوقوف .
يعامل معاملة البتر	
من ١٠٪ إلى ٣٠٪	
من ٢٠٪ إلى ٥٠٪	

النسبة المئوية لدرجة العجز	العجز المتخلف
من ٢٠٪ إلى ٣٠٪	الدوالي التي لا يمكن شفاؤها بالتدخل الجراحي ويتسبب عنها قرحة مزمنة . إصابات الرأس والجهاز العصبي المركزي فقد شعر فروة الرأس إصابة بالرأس نتج عنها فقد عظمي بالصفحة الخارجية والداخلية (حسب مساحة الجزء المفقود) . إصابة بالرأس مصحوبة أو غير مصحوبة بكسر الجمجمة ومصحوبة أو غير مصحوبة بإرتجاج بالمخ ونتج عنها دوخة أو ارتعاشات أو صدع أو لعثمة في الكلام أو نقص في القوى العقلية حسب شدة الحالة . إصابة بالرأس نتج عنها إضطراب عقلي .
من ١٠٪ إلى ٤٠٪	نزيف بالمخ مصحوب بشلل نصفي غير قابل للشفاء
من ٢٠٪ إلى ٧٠٪	شلل نصفي غير تام مع افازيا شلل نصفي أيمن غير تام شلل نصفي أيسر غير تام شلل نصفي تام مصحوب بتوتر العضلات شلل تام بالطرف العلوي الأيمن شلل تام بالطرف العلوي الأيسر شلل غير تام بالطرف العلوي الأيمن شلل غير تام بالطرف العلوي الأيسر افازيا بسيطة افازيا واضحة نوبات صرعية قليلة أو نادرة نوبات صرعية متعددة شلل الطرفين السفليين شلل الطرف السفلي مع القدرة على المشي . شلل الطرفين السفليين غير كامل أو المشي غير ممكن شلل الطرفين السفليين والمشي ممكن بعكاز أو بعصا
من ١٠٠٪	
من ١٠٠٪	
من ١٠٠٪	
من ٦٠٪ إلى ١٠٠٪	
من ٢٠٪ إلى ٤٠٪	
من ٧٠٪ إلى ١٠٠٪	
من ٨٠٪	
من ٧٠٪	
من ٢٠٪ إلى ٤٠٪	
من ١٥٪ إلى ٣٠٪	
من ١٠٪ إلى ٢٠٪	
من ٦٠٪ إلى ٣٠٪	
من ٢٠٪ إلى ٣٠٪	
من ٣٠٪ إلى ٨٠٪	
من ١٠٠٪	
من ٢٠٪ إلى ٤٠٪	
من ٧٠٪	
من ٣٠٪ إلى ٧٠٪	

النسبة المئوية لدرجة العجز	العجز المتخلف
من ٤٠٪ إلى ٧٠٪ من ٥٠٪ إلى ٧٠٪ ٥٪ ٣٥٪ ١٠٠٪ من ٥٪ إلى ١٠٪ من ١٠٪ إلى ٢٠٪ من ١٠٪ إلى ١٥٪ ٢٥٪ من ١٥٪ إلى ٢٠٪ من ١٠٪ إلى ٢٠٪ من ١٠٪ إلى ٢٠٪ من ٣٠٪ إلى ٥٠٪ من ١٠٪ إلى ٣٠٪ من ٢٠٪ إلى ٤٠٪ من ٢٠٪ إلى ٤٠٪ من ١٠٪ إلى ٣٠٪	تكهف الحبل الشوكي تليف الجهاز العصبي المركزي المنتثر <u>العصب الأول :</u> فقد حاسة الشم <u>العصب الثاني :</u> ضمور تام بالعصب البصري لعين واحدة ضمور تام مزدوج بالعصب البصري <u>العصب الثالث والرابع والسادس :</u> شلل بالعضلات الداخلية بإحدى العينين شلل بالعضلات الداخلية بالعينين شلل بالعضلات الخارجية بالعينين بدون ازدواج البصر شلل بالعضلات الخارجية مع ازدواج البصر <u>العصب الخامس :</u> التهاب بأطراف العصب الخامس مع تقلص عضلات نصف الوجه مصحوب بآلم شلل بالعصب الخامس مصحوب بفقد الحسية بنصف الوجه <u>العصب السابع :</u> شلل بالعصب الوجهي مع عدم القدرة على غلق جفني العين شلل بالعصب الوجهي مع عدم القدرة على غلق العينين معا <u>العنق</u> إنثناء العنق للأمام نتيجة تقلص العضلات أو أثره التئام ملتصقة إنثناء العنق التشنجي <u>العمود الفقري</u> سوكليوز أو لوردوز أو كيفوز مع تحديد في الحركة بروز أو إنخساف مصحوب بآلام وتحديد في الحركة

النسبة المئوية لدرجة العجز	العجز المتخلف
من ٣٠٪ إلى ٤٠٪	التهاب عظمي مفصلي تشوهي مع تيبس مفاصل الفقرات
من ٣٠٪ إلى ٨٠٪	التهاب عظمي مفصلي تشوهي مع تيبس مفاصل الفقرات وصعوبة التنفس
من ٣٠٪ إلى ٦٠٪	التهاب عظمي نخاعي بالفقرات مع سلامة النخاع الشوكي
من ٣٠٪ إلى ٤٠٪ من ٥٠٪ إلى ٧٠٪	مرض بوت غير مصحوب بخراج درني . مرض بوت مصحوب بخراج درني .
من ٥٪ إلى ٢٥٪	الأنف ضيق بالأنف بدون فقد ولا يمكن علاج الضيق . كسر بعظم الأنف مصحوب بضيق الخياشيم . فقد أرنبة الأنف . فقد جزئي بالأنف بدون ضيق الخياشيم . فقد الأنف بدون ضيق الخياشيم . فقد الأنف مصحوب بضيق الخياشيم .
١٥٪ ٨٠٪ من ١٠٪ إلى ٢٠٪ من ٢٠٪ إلى ٤٠٪ من ٢٠٪ إلى ٥٠٪	العين الجفون والمسالك الدمعية : إنحراف حافة الجفن للداخل أو الخارج أو التصاق الملتحمة الجفنية بملتحمة المقلة . ناسور دمعي مزمن غير قابل للشفاء من ناحية واحدة . ناسور دمعي مزمن غير قابل للشفاء من الناحيتين . تلف الحجاج .
من ٥٪ إلى ٨٠٪ ١٥٪ ٣٠٪ من ١٠٪ إلى ٢٥٪	المقلة : الكتاركتا الإصابية : (أ) عند وجود كتاركتا بالعين تسبب ضعفاً بالإبصار قد يصل إلى درجة الفقد التام تقدر نسبة العاهة بهذه العين بنسبة الإبصار المبينة بالفقرة (٤) من الجدول الخاص بحالات فقد الإبصار المرافق للقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٥ والمعدل بالقانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٧٧ إذا كانت عملية إزالة الكتاركتا لا تجدي في إصلاح دة الإبصار . (ب) إذا أجريت عملية إزالة كتاركتا إصابية تُقَدَّر العاهة حسب درجة الإبصار بعد عملية إزالة الكتاركتا باستعمال النظارة التي تُعتبر جزءاً تكميلياً للجراحة ويزاد ١٠٪ مقابل عدم إندماح الصورتين في حالة إزالة كتاركتا في عين واحدة وبحيث لا تتعدى العاهة في العين المجرى بها عملية إزالة كتاركتا عن ٣٥٪ .
٥٪ ١٠٪	الأذن فقد أو تشويه بصوان الأذن الخارجية فقد أو تشويه بصوان الأذنين

النسبة المئوية لدرجة العجز	العجز المتخلف
من ١٠٪ إلى ٢٠٪	الفك العلوي المضغ ممكن . المضغ غير ممكن . فقد بسقف الحلق متصل أو غير متصل بالحفرة الأنفية وبجيب الهواء الفكي . إصابة بالفك العلوي مع تشوه الأنف والوجه .
من ٢٠٪ إلى ٤٠٪	الفك السفلي المضغ ممكن . المضغ غير ممكن . خلع بالمفصل الفكي الصدغي يمكن أو لا يمكن رده . ضيق بالفم بسبب انكليوز الفكين . ضيق بالفم بسبب انكليوز الفكين يسمح بتناول السوائل فقط . فقد الفك السفلي بأكمله أو ببقاء الفرع الصاعد مع تشوه الوجه .
من ١٪ إلى ٥٪	الأسنان فقد لغاية خمسة أسنان فقد نصف الأسنان مع إمكان تركيب طقم صناعي . فقد نصف الأسنان مع عدم إمكان تركيب طقم صناعي . فقد الأسنان جميعها مع إمكان تركيب طقم صناعي .
من ١٠٪ إلى ٢٠٪	اللسان بتر اللسان حسب إتساعه والإلتصاقات وحالة الكلام . ناسور لعابي لم يتحسن بالعلاج الجراحي .
من ١٥٪ إلى ٤٠٪	البلعوم الأنفي ضيق بالبلعوم الأنفي ناتج عن التصاق الحلق بالجدار الخلفي للبلعوم . ضيق بالبلعوم مصحوب بالصمم .
من ٤٠٪ إلى ٦٠٪	البلعوم السفلي ضيق بالبلعوم يعيق البلع .
من ١٠٪ إلى ٣٠٪	الحنجرة درن الحنجرة . ضيق بالحنجرة تسبب بحه في الصوت . ضيق بالحنجرة تسبب بحه في الصوت مع ضيق التنفس . ضيق بالحنجرة تسبب عنه ضيق بالتنفس يستدعي وضع أنبوبة حنجرية . ضيق بالحنجرة تسبب عنه إنعدام الصوت مع تلف محدود بالأوتار الصوتية .
٢٠٪	
من ٢٠٪ إلى ٣٠٪	
من ٣٠٪ إلى ٦٠٪	
من ٣٠٪ إلى ٤٠٪	
من ٤٠٪ إلى ٥٠٪	

النسبة المئوية لدرجة العجز	العجز المتخلف
من ١٠٪ إلى ٣٠٪	المرئ ضيق بالمرئ يعيق البلع . المعدة قرحة مزمنة . قرحة مزمنة مع التصاقات مؤلمة أو ضيق . فتحة البواب مع تمدد المعدة ونحافة . ناسور معدي لم يشف بالعلاج الجراحي .
من ٣٠٪ إلى ٤٠٪	الأمعاء الدقيقة ناسور بالأمعاء في وضع مرتفع بالبطن . ناسور بالأمعاء في وضع منخفض بالبطن . فقد الأمعاء .
من ٤٠٪ إلى ٥٠٪	الأمعاء الغليظة ناسور لم يشف بالعلاج الجراحي ويسمح بخروج الغازات والسوائل مع بعض مواد البراز والتبرز عادي .
من ٥٠٪ إلى ٦٠٪	الشرج ناسور حسب موضعه خارج أو داخل العضلة العاصرة . ناسور مع عدم القدرة على حجز البراز أو إحتباس المواد البرازية نتيجة إصابة العضلة العاصرة ومصحوب أو غير مصحوب بسقوط الشرج أو التهاب معوي أو التهاب بريتنوني .
من ٦٠٪ إلى ٧٠٪	الكبد ناسور مراري أو صديدي .
من ٧٠٪ إلى ٨٠٪	الطحال استئصال الطحال السليم . استئصال الطحال المتضخم . استئصال الطحال المتضخم المصحوب باستسقاء بالبطن .
من ٨٠٪ إلى ٩٠٪	جدار البطن فتق أربي أيمن أو أيسر أو فتق سري أو فخذي فتق أربي مزدوج . فتق بجدار البطن أو فتق جراحي . شلل جزئي لعضلات البطن نتيجة تأثر عصب بجدار البطن
من ٩٠٪ إلى ١٠٠٪	المسالك البولية الكلى والحالب . التهاب بإحدى الكليتين . التهاب بإحدى الكليتين مع التهاب بحوض الكلية .

العجز المتخلف	النسبة المئوية لدرجة العجز
التهاب كلوي يسبب عدوى أو تسمماً . التهاب بحوض الكليتين . استئصال الكلية والأخرى سليمة (حسب حالة الكلية المستأصلة) استئصال الكلية والأخرى متكيسة . كلية متحركة درن بكلية واحدة . درن بالكليتين . ناسور بالحالب . ناسور بطني بولي . المثانة التصاق جدار المثانة بالإرتفاق العاني بسبب كسر ناسور بولي بالعامية أو العجان . ناسور مثاني معوي . ناسور مثاني شرجي . التهاب مثاني مزمن إصابي أو جرح بالمثانة استدعى تثبيت قسطرة . التهاب مثاني مع التهاب بحوض كلية واحدة . التهاب مثاني مع التهاب بحوض الكليتين . درن بالمثانة مع سلامة الكليتين . نحباس كلي بالبول نتيجة إصابة بالنخاع الشوكي انحباس جزئي بالبول . انحباس جزئي بالبول مصحوب بالتهاب كلية واحدة أو كليتين . عدم القدرة على حبس البول . قناة مجرى البول الخلفية ضيق كامل نتيجة تمزق قناة مجرى البول الخلفية . ضيق جزئي نتيجة تمزق قناة مجرى البول الخلفية . ضيق يمكن توسيعه بالعملية الجراحية . ضيق مصحوب بناسور متصل ما بين الشرج وقناة مجرى البول . قناة مجرى البول الأمامية . ضيق يمكن توسيعه . ضيق يصعب توسيعه . ناسور بولي . انعدام قناة مجرى البول الأمامية مع فتحة بالعجان انعدام قناة مجرى البول الأمامية ما بين السرة والعجان .	من ٤٠٪ إلى ٦٠٪ من ٤٠٪ إلى ٦٠٪ من صفر إلى ١٥٪ ٥٠٪ من ٥٪ إلى ٨٠٪ ٥٠٪ من ٥٠٪ إلى ٨٠٪ ٥٠٪ من ٤٠٪ إلى ٦٠٪ من ٤٠٪ إلى ٥٠٪ ٥٠٪ من ٥٠٪ إلى ٧٠٪ من ٣٠٪ إلى ٤٠٪ ٥٠٪ من ٢٠٪ إلى ٣٠٪ ٤٠٪ من ٢٠٪ إلى ٣٠٪ من ٢٠٪ إلى ٣٠٪ ٧٠٪ ٥٠٪ من ٢٠٪ إلى ٤٠٪ من ٤٠٪ إلى ٦٠٪ من ٢٠٪ إلى ٣٠٪ من ٣٠٪ إلى ٤٠٪ ٣٠٪ ٥٠٪ ٤٠٪

النسبة المئوية لدرجة العجز	العجز المتخلف
من ١٠٪ إلى ٢٠٪ من صفر إلى ٢٠٪ من ٥٪ إلى ٢٠٪ من ٢٠٪ إلى ٥٠٪ من ٥٠٪ إلى ٨٠٪ من ٥٪ إلى ٣٠٪ من ٨٠٪ إلى ٤٠٪ من ٢٠٪ إلى ٧٠٪ من ٥٪ إلى ٨٠٪ من ٨٠٪ إلى ٤٠٪ من ٤٠٪ إلى ٧٠٪ من ٧٠٪ إلى ٨٠٪ من ٨٠٪ إلى ٣٠٪ من ٣٠٪ إلى ٦٠٪ من ٦٠٪ إلى ٩٠٪ ٨٠٪ تقدر نسبة العاهة بنسبة النقص في الطاقة التنفسية من ١٠٪ إلى ٥٠٪ من ٥٠٪ إلى ٩٠٪ من ٩٠٪ إلى ٨٠٪ من ٨٠٪ إلى ٩٠٪ ٨٠٪ من ٨٠٪ إلى ٢٠٪ من ٢٠٪ إلى ٦٠٪ ٨٠٪ من ٣٠٪ إلى ٩٠٪ من ٣٠٪ إلى ٨٠٪	القفس الصدري كسر عظم القفس غير مصحوب بإصابة حشوية . كسر ضلع حسب المضاعفات . الرئتان التهاب شعبي مزمن خفيف . التهاب شعبي مزمن شديد . التهاب شعبي مزمن مضاعف بانفزيما أو تمدد شعبي أو ربو أو هبوط بالقلب . إنسكاب للوروي إصابي . إنسكاب دموي للوروي . إنسكاب صديدي للوروي . إصابة درنية تخلف عنها تلفيات بسيطة . إصابة درنية تخلف عنها تلفيات متوسطة . إصابة درنية تخلف عنها تلفيات شديدة . إصابة درنية متقدمة غير قابلة للشفاء . سليكوزس مصحوب بتليف بسيط في الرئتين . سليكوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين . سليكوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين . سليكوزس مصحوب بدران بالرئتين . اسبستوزس مصحوب بتليف بسيط بالرئتين . اسبستوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين . اسبستوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين . اسبستوزس مصحوب بدران بالرئتين . بسيسنوزس (ربو القطن أو الكتان) وغير مصحوب بتغيرات في أشعة الرئتين . بسيسنوزس مصحوب بنزلة شعبية مزمنة وربو شعبي بسيسنوزس مصحوب بانفزيما . امفزيما نتيجة استنشاق أبخرة . امفزيما نتيجة النفخ في الآلات . أورام خبيثة نتيجة استنشاق أبخرة أو أتربة . القلب والأورطي التصاق بغشاء القلب أو إصابة بصمام القلب أو التهاب بعضلات القلب أو تلف بعضلات القلب نتيجة جلطة بالشرابين التاجية . والقلب متكافئ . مع بعض أعراض ظاهرة . مع عدم تكافؤ القلب . تأثر القلب والكليتين نتيجة حدوث عدوى أو تسمم . انيورزم الأورطي أو جدار القلب .

النسبة المئوية لدرجة العجز	العجز المتخلف
	أعضاء التناسل
صفر	اثره التئام بالقضيب لا تمنع الإنتصاب
٪٢٥	فقد ثمرة القضيب .
٪٣٠	انعدام جزئي بالجسم الاسفنجي .
٪٦٠	فقد القضيب .
٪٧٠	فقد القضيب مع ضيق بفتحة مجرى البول .
٪٩٠	فقد القضيب مع الخصيتين .
٪٣٥	فقد خصية قبل البلوغ .
٪٢٥	فقد خصية من سن البلوغ لغاية ٤٠ سنة .
٪١٥	فقد خصية بعد سن الأربعين .
٪٦٠	فقد خصيتين قبل سن البلوغ .
٪٤٠	فقد خصيتين من سن البلوغ لغاية سن الأربعين
٪٣٠	فقد خصيتين بعد سن الأربعين .
من صفر إلى ٪١٠	قلة مائية حسب الحجم والمضاعفات .
من ٪١٠ إلى ٪١٥	قلة دموية إصابية .
من ٪١٠ إلى ٪١٥	درن البربخ والخصية من ناحية واحدة .
من ٪٢٠ إلى ٪٤٠	درن البربخ والخصية من الناحيتين .
من ٪٤٠ إلى ٪٥٠	درن البربخ والبروستاتا والحويلة المنوية .
	الإناث
من ٪٤٠ إلى ٪٦٠	فقد الرحم والمبايض قبل سن البلوغ .
٪٤٠	فقد الرحم قبل الإنجاب .
٪٣٠	فقد الرحم بعد الإنجاب
٪٣٠	فقد مبيض واحد قبل أو بعد سن البلوغ .
من ٪٥ إلى ٪١٥	سقوط الرحم أو المهبل .
	الغدد الدرقية
من ٪٥ إلى ٪٢٠	غدد درقية .
من ٪٢٠ إلى ٪٢٥	غدد درقية متقيحة مصحوبة بنواسير .
من ٪٤٠ إلى ٪١٠٠	سرطان الغدد .
	الأورام الخبيثة
	تقدر نسبة العجز حسب فقد العضو لوظيفته أو بتره أو انتكاس الحالة أو عدم إمكان إجراء عملية .
من ٪٤٠ إلى ٪١٠٠	
	بعض الأمراض
٪٥٠	الزهري كمرض مهني .
من ٪٢٠ إلى ٪٤٠	ناسور معاود واحد أو متعدد وحسب الموضع .
من ٪٢٠ إلى ٪١٠٠	سرطان الدم